

PRODUKTEINFORMATION

PLANTOSVERDE® Blattdünger – 100 % biologisch

Ökologisch/biologisches Erzeugnis gemäss Verordnung (EG) 834/2007 – 889/2008

DOSIERUNG / ANWENDUNG:

PLANTOSVERDE® Blattdünger in 200 -300 Liter Wasser per ha.
10 kg reichen für 3 Anwendungen pro Hektar.

Dosierung bei Kulturen: (jeweils pro ha)

- Mais:**
- | | |
|---------------|--|
| 1. Anwendung: | 3 kg wenn Pflanze 20-25 cm hoch ist |
| 2. Anwendung: | 3 kg 3-4 Wochen später |
| 3. Anwendung: | 3 kg bevor die Pflanze zu hoch wird um darüber ohne Beschädigung zu fahren |
- Kartoffel:**
- | | |
|---------------|--|
| 1. Anwendung: | 3 kg wenn die Pflanze etwa 15-20 cm gross ist, 4 Blätter hat |
| 2. Anwendung: | 3 kg 14-21 Tage später |
| 3. Anwendung: | 3 kg nach der Blüte |
| 4. Anwendung: | 2 kg 14-21 Tage später |
- Kern- und Steinobst:**
- | | |
|---------------|---|
| 1. Anwendung: | 3 kg wenn die ersten Blätter da sind |
| 2. Anwendung: | 3 kg 14-21 Tage später |
| 3. Anwendung: | 3 kg nach der Blüte |
| 4. Anwendung: | 3 kg nach 21-28 Tagen (Bei Trockenheit , oder Insektenbefall öfter) |
- Getreide (Weizen, Gerste, Triticale, Hafer, Roggen etc.):**
- | | |
|---------------|--------------------------------------|
| 1. Anwendung: | 3 kg wenn die Pflanze etwa 20 cm hat |
| 2. Anwendung: | 3 kg 21 Tage danach |
| 3. Anwendung: | 3 kg nach der Blüte |
- (bei Trockenheit oder Insektenbefall ein 4. Mal 3 Kg anwenden)
- Wintergetreide, Winterraps:**
- | | |
|---------------|--|
| 1. Anwendung: | 3 kg im Herbst, wenn die Pflanze etwa 10-15 cm hat |
| 2. Anwendung: | 3 kg im Frühjahr, wenn zum ersten Mal möglich |
| 3. Anwendung: | 3 kg 14 Tage vor der Blüte |
| 4. Anwendung: | 3 kg nach der Blüte plus 14 Tage |
- Raps:**
- | | |
|---------------|--|
| 1. Anwendung: | 3 kg wenn die Pflanzen 20 cm hoch sind |
| 2. Anwendung: | 3 kg 21 Tage danach |
| 3. Anwendung: | 3 kg nach der Blüte |
- Weinrebe:**
- | | |
|---------------|--------------------------------------|
| 1. Anwendung: | 1,5 kg im 4-Blatt Stadium |
| 2. Anwendung: | 3 kg nach 14 Tagen |
| 1. Anwendung: | 3 kg nach 14 Tage bzw.nach der Blüte |
| 2. Anwendung: | 21 – 28 Tage später |
- Bei grosser Trockenheit oder anderen Stressfaktoren (Frost, Insektenbefall, Mehltau etc.) wird eine zusätzlich Anwendung empfohlen.
- Rüben:**
- | | |
|---------------|--|
| 1. Anwendung: | 2,5 kg wenn die ersten 4 Blätter sichtbar sind |
| 2. Anwendung: | 14-21 Tage später |
| 3. Anwendung: | 28 Tage später |
- (bei grosser Trockenheit empfiehlt sich eine zusätzliche Anwendung)

Soya:

1. Anwendung:	3 kg wenn die ersten Blätter da sind
2. Anwendung	3 kg nach 14 Tagen
3. Anwendung	3 kg nach 3 – 4 Wochen später
4. Anwendung	3 kg nach der Blüte

Ausbringen möglichst am Morgen oder späteren Nachmittag (nicht an praller Sonne oder bei Morgentau)

Baumwolle:

1. Anwendung:	3 kg wenn die ersten Blätter da sind
2. Anwendung	3 kg nach 14 Tagen
3. Anwendung	3 kg nach 3 – 4 Wochen später
4. Anwendung	3 kg nach der Blüte

Ausbringen möglichst am Morgen oder späteren Nachmittag (nicht an praller Sonne oder bei Morgentau)

Anwendung

- Zunächst in Eimer mit Wasser anrühren, nach einigen Minuten nochmals umrühren, bis keine trockenen Elemente mehr zu sehen sind. Das Material löst sich zu ca. 2,5 % chemisch auf, der Rest bleibt eine Suspension, die sicher 6 Stunden versprüht werden kann, dann erneut umrühren.
- Je nach Vorgabe pro ha 2,5 bis 4 kg auf 1'000 Liter Wasser.
- Aussprühen, Nebel, Geschwindigkeit, Düse wie bei herkömmlichen Spritzmittel.
- Die Häufigkeit der Anwendung beträgt 2 bis 4 Applizierungen in Abständen von 10 – 15 Tagen während der Vegetationsperiode.
- Ausbringen möglichst am Morgen oder späteren Nachmittag (nicht an praller Sonne).
- Bei Stress der Pflanzen durch Schädlingsbefall, Hagel etc. mit einer Verdünnung von 1% (1 kg/1'000 Liter Wasser) zusätzlich besprühen.
- Bei mehrjährigen Pflanzen beachten, dass das PLANTOSVERDE® Präparat die Vegetations-phase verlängert – die letzte Anwendung sollte ca. 30 Tage vor der Ernte stattfinden.
- PLANTOSVERDE® kann nicht überdosiert werden, da es keine schädliche Wirkungen und Karenzen hervorruft.

PLANTOSVERDE® Blattdünger kann mit allen handelsüblichen Dünge- und Pflanzenschutzmitteln kombiniert werden.

INFOBLATT Kartoffel – Zuckerrübe – Mais – Zwiebel

PLANTOSVERDE® Blattdünger – 100 % biologisch

Ökologisch/biologisches Erzeugnis gemäss Verordnung (EG) 834/2007 – 889/2008

1. Zeitpunkt der Ausbringung

Kartoffel:

1. Anwendung: 3 kg/ha bei einer Pflanzhöhe von ca. 15 – 20cm, 4 Blätter hat
2. Anwendung: 3 kg/ha nach 14 – 21 Tagen
3. Anwendung: 3 kg/ha nach der Blüte
4. Anwendung: 2 kg/ha nach 14 – 21 Tagen

Zuckerrübe:

1. Anwendung: 3 kg/ha bei einer Pflanzenhöhe von ca. 10 cm
2. Anwendung: 3 kg/ha nach 21 Tagen
3. Anwendung: 3 kg/ha nach 21 Tagen

Mais:

1. Anwendung: 3 kg/ha bei einer Pflanzenhöhe von ca. 20-25 cm
2. Anwendung: 3 kg/ha nach 21 – 28 Tagen
3. Anwendung: 3 kg/ha bevor die Pflanze zu hoch wird, um darüber ohne Beschädigung zu fahren.

Zwiebel:

1. Anwendung: 3 kg/ha bei einer Pflanzenhöhe von ca. 10 cm
 2. Anwendung: 3 kg/ha nach 10 – 14 Tagen
 3. Anwendung: 3 kg/ha nach 10 – 14 Tagen
-

2. Anwendung

- Zunächst in Eimer mit Wasser anrühren, nach einigen Minuten nochmals umrühren, bis keine trockenen Elemente mehr zu sehen sind. Das Material löst sich zu ca. 2,5 % chemisch auf, der Rest bleibt eine Suspension, die sicher 6 Stunden versprüht werden kann, dann erneut umrühren.
 - Je nach Vorgabe pro ha 2,5 bis 4 kg auf 1'000 Liter Wasser.
 - Ausprühen, Nebel, Geschwindigkeit, Düse wie bei herkömmlichen Spritzmittel.
 - Die Häufigkeit der Anwendung beträgt 2 bis 4 Applizierungen in Abständen von 10 – 15 Tagen während der Vegetationsperiode.
 - Ausbringen möglichst am Morgen oder späteren Nachmittag (nicht an praller Sonne).
 - Bei Stress der Pflanzen durch Schädlingsbefall, Hagel etc. mit einer Verdünnung von 1% (1 kg/1'000 Liter Wasser) zusätzlich besprühen.
 - Bei mehrjährigen Pflanzen beachten, dass das PLANTOSVERDE® Präparat die Vegetationsphase verlängert – die letzte Anwendung sollte ca. 30 Tage vor der Ernte stattfinden.
 - PLANTOSVERDE® kann nicht überdosiert werden, da es keine schädliche Wirkungen und Karenzen hervorruft.
-

3. Wichtige Hinweise

- **Material und Sprühgefäss von Kindern fernhalten.**
- **Auf den Blättern bildet sich ein grauer Schleier, der unbedenklich ist.**

INFOBLATT Früchte – Salat – Gemüse – Rasen

PLANTOSVERDE® Blattdünger – 100 % biologisch

Ökologisch/biologisches Erzeugnis gemäss Verordnung (EG) 834/2007 – 889/2008

1. Zeitpunkt der Ausbringung

Erdbeere:

- | | |
|---------------|---------------------|
| 1. Anwendung: | vor der Blüte |
| 2. Anwendung: | nach der Blüte |
| 3. Anwendung: | 14 – 21 Tage später |
| 4. Anwendung: | 14 – 21 Tage später |

Salat:

- | | |
|---------------|---------------------|
| 1. Anwendung: | nach dem Setzen |
| 2. Anwendung: | 10 – 14 Tage später |
| 3. Anwendung: | 10 – 14 Tage später |

Tomaten/Gemüse:

- | | |
|---------------|----------------------------------|
| 1. Anwendung: | nach Austrieb der ersten Blätter |
| 2. Anwendung: | 14 – 21 Tage später |
| 3. Anwendung: | 14 – 21 Tage später |

Die erste Anwendung sollte sofort nach dem Umsetzen der Setzlinge oder nachdem die ersten Blätter sichtbar sind, erfolgen. Im Glashaus sollen die weiteren Ausbringungen bereits nach sieben Tagen erfolgen.

Rasen:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Anwendung: | Ende März – Anfang April – danach beliebiger Einstieg |
| Weitere Anwendungen: | alle 21 Tage |
| Letzte Anwendung: | Ende Oktober, um Frostschäden zu vermeiden |
-

2. Anwendung

- Einen Teelöffel (ca. 3 – 4 g pro 1 Liter Wasser) zunächst in kleinem Gefäss mit wenig Wasser anrühren, mit entsprechendem Wasser auffüllen, gut umrühren oder schütteln, bis keine trockenen Elemente mehr zu sehen sind. Das Material löst sich zu ca. 2,5 % auf, der Rest bleibt eine Suspension, die sicher 6 Stunden versprüht werden kann, dann erneut umrühren oder schütteln.
 - Abweichungen von Mengenangaben sind unbedenklich.
 - Die Lösung kann beliebig aufbewahrt werden. Bei Wiederverwendung lediglich wieder umrühren oder schütteln.
 - Aussprühen als möglichst feinen Nebel auf das Blatt, ev. auch Unterseite.
 - Besprühen am Morgen oder späteren Nachmittag (nicht an praller Sonne).
 - Bei Stress der Pflanzen durch Schädlingsbefall, Hagel etc. mit einer Verdünnung von 1% (1g/1l Wasser) zusätzlich besprühen.
-

3. Wichtige Hinweise

- **Material und Sprühgefäss von Kindern fernhalten.**
- **Auf den Blättern bildet sich ein grauer Schleier, der unbedenklich ist. Wir empfehlen jedoch, Zierpflanzen in der Wohnung (aus optischen Gründen) nicht zu besprühen, auch um Verschmutzung von Fussböden oder Vorhängen zu vermeiden. In der Wohnung kann die Lösung auch als Giesswasser verwendet werden – in diesem Fall die 3fache Menge Pulver abmischen.**